Agrovitech nutriciónVegetal

QUELAGROW Cobre

VÍA FOLIAR

PRESENTACIONES

250 cc, 500 cc, 1 Litro, 4 Litros y 20 Litros

COMPOSICIÓN QUIMICA

Análisis Garantizado	% P/V
Cobre (Cu)	6%
Azufre (S)	3.2%

QUELAGROW COBRE es un fertilizante líquido formulado a base de sulfato de cobre pentahidratado (25%), agentes quelatantes (aminas) y materia orgánica para aplicaciones foliares, aunque también es altamente eficiente en aplicaciones al suelo.

QUELAGROW COBRE fisiológicamente actúa en la producción de enzimas en la planta, mejora de la integridad de la pared celular y procesos simbióticos de nitrógeno, porque su función es corregir deficiencias específicas en la asimilación de cobre. Participa en el metabolismo de las plantas, regula la transpiración, el transporte de energía en la fotosíntesis y la producción de enzimas.

QUELAGROW COBRE tiene una acción como bactericida, fungicida preventivo, curativo y de acción sistémica, contra una amplia gama de enfermedades que afectan los cultivos ornamentales, frutales, hortalizas y cultivos extensivos varios. Las moléculas de cobre son asimilables por el follaje, transportándolas en forma sistémica a los tejidos de toda la planta. Actúa tanto a nivel floemático como xilemático, inhibiendo los procesos reproductivos y destruyendo la pared celular de hongos y bacterias.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS / 200 LITROS DE AGUA	EPOCA DE APLICACIÓN	VIA DE APLICACIÓN
Papa (Solanum tuberosum).	1,5 cc/ L. de agua (300 ml /ha)	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 30 días.	Via Foliar
Tomate (Lycopersicon esculentum), Cebolla (Allium cepa), Zanahoria (Daucus carota), Haba (Vicia faba), Brocoli (Brassica oleracea var. italica), Frutilla (Fragaria), Pimiento (Capsicum annum),	1,5 cc/ L. de agua (300 ml /ha)	Realizar 2 aplicaciones cada 30 días iniciando a los 30 después de transplante.	
Cacao (Theobroma cacao), Café (Coffea arabica), Naranja (Citrus sinensis), Platano (Musa spp).	1,5 cc/ L. de agua (300 ml /ha)	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 30 días.	
Aguacate (Persea auericana), Manzana (Malus pumila), Tomate de Arbol (Solanum betaceum).	1,5 cc/ L. de agua (300 ml /ha)	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 30 días.	
Maiz (Zea mays), Arroz (Oryza satina), Caña de Azucar (Saccharum officinarum).	1,5 cc/ L. de agua (300 ml /ha)	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 30 días.	
Sandía (Citru/lus vulgaris), Papaya (Carica papaya).	1,5 cc/ L. de agua (300 ml /ha)	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 30 días.	
Piña (Ananas comosus).	1,5 cc/ L. de agua (300 ml /ha)	Desde el inicio del cultivo y repetir cada 30 días.	

GATILLO DE ACCIÓN:

Absorción vía estoma cutícula.
Nutrientes altamente asimilables.

6 001 220 info@agrovitech.com
Isla Genovesa 228 y General Rumiñahui QUITO - ECUADOR